

Beraunen, Randaberg

Rullesteinvollen på Beraunen er freda som geologisk naturminne. Raunen er blant dei rikaste plantesamfunnene i landet. Brakkvassområde og naturberitemarker er attraktive for vannfuglar. Rike kulturmiljø.


Landskapsvernområde med plante- og fuglefreding, og Ramsar-status. 3236 dekar, verma i 2003.



Linemyr, Time

Rest av torvmyr, ein naturtype som er mesten borte på Jæren. Viktig hekkebiotop for fuglar. Myra har vore sterkt tilgrodd med bjerk og vier, men nå blir mesteparten av denne vegetasjonen fjerna for å få attende den opprinnelige naturtypen.


Naturreservat med Ramsar-status. 59 dekar, verma i 1996.



Grannesbukta, Sola

Hafsfjord har fleire grunne bukter og vågar som er viktige raste- og overvintringsområde for vassfugl. Tre områder er verma som naturreservat, mellom andre Grannesbukta lengst inne i Hafsfjord.

Naturreservat med Ramsar-status. 62 dekar, verma i 1996.



Grudavatn, Klepp

Grudavatn er eit særskilt hekke- og oppholdsområde for vassfugl og spurvefugl. Vatnet som er ein del av Figgjoelva, har ein særleg viktig funksjon for trekkfugl og overvintrande fugl. Det er registrert meir enn 200 fuglearter i reservatet.

Naturreservat med fuglelivsfreding og Ramsar-status. 2619 dekar, verma i 1974.



Håstein og Rott, Sola

Øyene Rott og Håstein med omkringliggjande holmar har eit helt unikt fugle-, plante- og dyreliv. I øyriket hekker det ei rekke arter av sjefuglar, og selartane steinkobbe og havert har tilhold her. Viktig også som overvintringsområde. Rike kulturmiljø på Rott.

Landskapsvernområde med fuglefreding. Foreslått Ramsar-status. Ca 96 000 dekar, det meste sjøareal. Verma i 2003.

Visste du at...
... rullesteinvollen på
Beraunen "lever"? Steinane
 blir dreid, snurra, løfta og kasta
 av bølgjekraften ved stormsjø.
 ... Hafsfjord hadde kontakt med
 havet ved Solastranda? Etter siste
 istid heva landjorda seg og
 havbotn ved Sola flyplass
 og Solastranda vart
 fast land.

4

